

የካውፒ (Cowpea) ተክልን ስከብት መኖነት በአንስተኛ እርሻ ላይ ማልማት

ዓላማ:

በቅሳማና መካከለኛ እርጥበት ባላቸው ቅሳማ ቦታዎች ገበሬዎች ለሚደረገው ክብቶች ጥራት ያለው የክብት መኖን ለማቅረብ ነው።

የተክሉ ሁኔታ መግለጫ

- ጠንካራ ግንድ የሌለው ሀረግ መሰል ሆኖ ቅጠሎችና ፍሬዎች ያሉት በፍጥነት የሚያድግ በያመቱ የሚደርስ መኖን ነው፤
- የተለያዩ የአፈር ዓይነቶች የሚስማሙት ሲሆን ድርቅን መቋቋም ይችላል፤
- የአፈር ስምነትን ለማሻሻል የሚበጅና ከሌሎች አገዳ እህሎች ጋር ሲዘራ ይችላል፤
- ከፍተኛ የገንቢነት ጥቅም ያለውና ስከብቶች በጣም ተስማሚ ነው፤
- እንደተቆረጠ እርጥቡ በሽክም ሲቀርብ ወይም ድርቅን መሆን ይችላል።

ደካማ ገኛች

- ከፍተኛ ግጦሽ መከሰቱ ይኖርበታል፤
- ቅዝቃዜ፣ ከባድ ዝናብ ወይም ውርጭ አይስማማውም፤
- በተባዮችና በበሽታ በቀላሉ የሚጠቃ ተክል ነው።

አሠራር

የማሳ ዝግጅት

- በደንብ ታርሶ የተዘጋጀ መሬት ያስፈልጋል።

ዘር መዝራት

- በሂክታር 25–30 ኪ/ግ ዘር በአንድ ሂክታር መሬት ላይ በ3 ሴንቲ ሜትር ጥልቀት ዘርቶ



ማልበስ ወይም ከ30 እስከ 60 ሳንቲ ሜትር በየመስመሩ መሃልና ከ10 እስከ 15 ሳንቲ ሜትር በየተክሉ መሃል እየተው መትከል ያስፈልጋል።

ማዳበሪያ

- በዘር ወቅት 100 ኪ/ግ ዳፕ ለአንድ ሂክታር መጠቀም፤

አጫዳ

- ሰብሶ አገንብሶ ለአጫዳና ለማንገዝ እንዳያስቸግር የአፍቱ ሁለት ሦስተኛው እጅ ደረቅ ሲልና ሲያነቃንቁት መንጃሂት ሲጀምር መቀረጥ ይቻላል። ከወቂያ በፊት ቅጠሉ በደንብ መድረቅ ይኖርበታል። ካውፒ ሲደረስ በእጅ ወይም በክብቶች ወይም በመሳሪያ ማጫድ ይቻላል።

ወጤት

- ከ12 እስከ 16 ሳምንታት ውስጥ ከ3 እስከ 10 ቶን ደረቅ መኖን በሂክታር ይሰማል። ዘር ከተሰበሰበ በኋላ ተረፈ ምርቱ ለመኖነት

ይውላል። የተረፈ ምርቱ የፕሮቴን ይዘት ከ10–15% ሲሆን አበባ እንዳፈራ ከሆነ የፕሮቴን ይዘቱ እስከ 30% ሲደርስ ይችላል።

ዘር ማባዛት

- የደረሱ የካውፒ ዘሮችን በየጊዜው በእጅ መልቀም ጥሩ ውጤት ያስገኛል። አማካይ ውጤት 750 ኪ/ግ በሂክታር ነው። ነገር ግን ጥሩ አድራሻ ከተደረገበት ማሳ በጥሩ አየር ጠባይ እስከ 1500 ኪ/ግ ዘር ሊገኝ ይችላል። ዘሩ በተባዎች እንዳይጠቃ ተስማሚ ፀረ ተባይ መጠቀምና በቀዝቃዛ ስፍራ ማኖር ያስፈልጋል።

አጠቃቀም

- የካውፒ ተክልን በቡቃያው ወቅት በየ3 እና 4 ሳምንታት ጊዜ እየጠበቁ ርጥቡን በሽክም ስመኖነት ማቅረብ ይቻላል። በየ7 እና በየ8 ሳምንቱ ደግሞ ቅርጦ ድርቅሽ ማድረግና በሽክም ርጥቡን ከማቅረብ ጋር እያለዋወጡ መጠቀም ወይም ከ3 እስከ 4 ወራት ጠብቆ ቡቃያው ሲደርስ ቅርጦ ተረፈ ምርቱን

ማግኘትም ሲላው አማራጭ ነው። ተክሉን ብቻውን ወይም ከሌሎች እንደበቆሉና ዘንጋዳ ካሉት ጋር አብሮ ማምረት ይቻላል። ካውፒ ስጥገቶች ከፍተኛ ጥራት ያለው መኖ ነው። ጥንቃቄ ከተደረገበት ጥሩ ድርቅሽ መሆን ይችላል። ግንዱ ቶሎ ስለማይደርቅ ጊዜ ወስዶ በጥንቃቄ ማድረቅ ተገቢ ነው። የካውፒ ተክል ከበቆሉና ከዘንጋዳ ጋር ሲደባለቅ ናይትሮጅን በማመንጨት ተረፈ ምርቱ በቀላሉ እንዲበላ ያደርጋል።

