



AICCRA

Accelerating Impacts of CGIAR
Climate Research for Africa



Climate Smart Feed and Forage Innovations Training Workshop

የተሻሻሉ የመኖ ሰብሎችን በኢትዮጵያ ደጋማና
ወይና ደጋ አካባቢዎች አመራረትና አጠቃቀም

Melkamu Bezabih | Aberra Adie | Getnet Assefa | Kindu Mekonnen
| Million Gebreyes | 16-18 May 2022 | Bahir Dar | Ethiopia

መግቢያ

በሀገራችን የእንስሳት መኖር በበቂና በጥራት አለመኖሩ የእንስሳት ምርታማነት በጣም ዝቅተኛ አድርጎታል

ያሉት የእንስሳት መኖሮች ጥራታቸው ዝቅተኛ አቀርቦቱም ውስን ነው

- የተፈጥሮ ግጦሽ ቦታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠበቡ ከመምጣታቸው ባሻገር የተራቆቱ ናቸው
- የግብርና ሰብል ተረፈ ምርቶች የንጥረ ምግብ ይዘታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው
- የድጎማ መኖሮች ዋጋቸው ውድ ነው፤ እንዲሁም የትም ቦታ በቀላሉ አይገኙም

አሁን ባለው የድጎማ መኖር አቅርቦት ሁኔታ እንስሳት አርቢዎች ምርታማነታቸውን ትረጉም ባለው ሁኔታ ለማሳደግ የተሻሻሉ የመኖር ስብሎቶችን አምርተው መጠቀም ተስፋ ሰጪ አማራጭ ነው

የስልጠናው ዓላማዎች

- የተሻሻሉ የመኖ ሰብሎች እንስሳትንና ሰብልን በጥምር በሚያመርቱ ገበሬዎች የእንስሳት እርባታን ለማዘመንና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ያላቸውን ጠቀሜታ ለመረዳት
- የተሻሻሉ የመኖ ሰብሎች ጠቀሜታና ዋና ዋና ባህርያትና የአጠቃቀም ዘዴዎች ግንዛቤ ለመስጠት
- በደጋማና ወይና ደጋ አካባቢዎች የተሻሻሉ የመኖ ሰብሎች የአመራረት የግብርና ዘዴ ምን እንደሚመስል ግንዛቤ መፍጠር
- ለእንስሳት አርቢዎችና መኖ አምራቾች የተለያዩ የመኖ ዝርያዎችን እንዴት በአግባቡ እንደሚያመርቱና እንደሚጠቀሙ ምክር መስጠት

የመኖ ሰብሎችን ለምን ማልማት ያስፈልጋል ?

1. ገበሬዎች በአካባቢያቸው በቀላል ዋጋ ጥራት ያለው መኖ ማምረት ስለሚያስችል

- ለአብዛኛው አነስተኛ ገበሬ የመኖ ሰብሎችን በአካባቢያቸው ጥራት ያለው መኖ ማምረት ጠቃሚ ነው ምክንያቱም የተመጣጠነ የድጎማ መኖ ለመግዛት ዋጋው ውድ ከመሆኑም በላይ በቅርብ ማግኘት ስለሚያስችግር።
- የመኖ ሰብሎችን በአካባቢያቸውን በተለያዩ አማራጭ መንገዶች ማልማት ይቻላል



የመኖ ሰብሎችን ለምን ማልማት ያስፈልጋል ?

2. የተሻሻሉ መኖዎች ምርታማነታቸው ክፍተኛ ነው

ተ.ቁ	የመኖ ሰብሎ ዓይነት	የድርቆሽ ምርት ቶን በሄክታር
1	የሳር መኖ ዝርያዎች (Grasses)	8 - 15
2	የቅጠላቅጠል መኖ ሰብሎች (Legumes)	6 - 10
3	የቅንጠባ መኖ ዛፎች (Browse trees)	6 - 13
4	የተፈጥሮ ግጦሽ (Natural Pasture)	1 - 2

- የመኖ ምርታማነቱና ጥራቱ እንደዝርያው ዓይነት ይለያያል
- የመኖ ሰብሎች ዓመታዊ ወይም ሰንባች ሊሆኑ ይችላሉ
- የመኖ ሰብሎችን በዝናብ ወይም በመስኖ ማልማት ይቻላል



የመኖ ሰብሎችን ለምን ማልማት ያስፈልጋል ?

3. የመኖ ሰብሎች ጥምር ጠቀሜታ አላቸው፤ ለእንስሳት መኖነት፤ ለሰው ምግብነት እንዲሁም ለማገዶ ይጠቅማሉ

- የተወሰኑ የመኖ ሰብሎች ከፍተኛ ጥራት ያለው የእንስሳት መኖ ይሰጣሉ
- የከብት አተርን የመሳሰሉ መኖዎች ፍሪያቸው ለሰው ምግብነት ቅጠላቸው ደግሞ ለእንስሳት መኖነት ይውላል
- የቅንጠባ መኖ ዘፎች ግንድና ቅርንጫፎች ለማገዶነት ይጠቅማሉ

ለምሳሌ - የእርግብ አተር፣ የከብት አተር



የመኖ ሰብሎችን ለምን ማልማት ያስፈልጋል ?

4. የአካባቢ ጥበቃ አገልግሎት

- የመኖ ሰብሎች በተዳፋት ቦታዎች ላይ በሚዘራበት ወይም በሚተከሉበት ጊዜ የአፈር መሸርሸርና ይከላከላሉ እንዲሁም የዝናብ ውሃ ወደ መሬት ውስጥ ሰረጎ እንዲገባ ያደርጋሉ
- የቅጠላቅጠል የመኖ ሰብሎች የመሬት ለምነትን ይጨምራሉ
- የመኖ ሰብሎች በአየር ውስጥ ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ በመምጠጥ የአካባቢ ሙቀት መጨመርን ይከላከላሉ
- ጥራቱ ከፍተኛ የሆኑ መኖዎችን ለእንስሳት መመገብ እንስሳት የሚያመነጩትን አየር በካይ ጋዝ መጠን ይቀንሳል



የመኖ ሰብሎችን ለምን ማልማት ያስፈልጋል ?

5. ከመኖ ሰብሎች ልማት ጋር የተቀናጀ የእጭቅ በሽታና ተባይ ቁጥጥር

- የበቆሎ አገዳ ትል (maize stem borers) የዝሆኔ ሳረና ዲሰሞዲየምንና በቆሎን በቅንጅት በመዝራት መከላከል ይቻላል. ከዚህም በተጨማሪ ጠራት ያለው መኖ ማመረት ያስችላል
- የመኖ ሰብሎችን ከምግብ ሰብሎች ጋር በፈረቃ መዝራት የተለያዩ የሰብል በሽታዎች፣ ተባዮችንና አረሞችን መቆጣጠር ያስችላል



የመኖ ሰብሎችን ለምን ማልማት ያስፈልጋል ?

6. የመኖ ሰብሎች የገቢ ምንጭ ናቸው

- የመኖ ሰብሎችን ለገቢያ ማምረት አወጭ የስራ መስክ ነው
- የመኖ ሰብሎች በአረንጓዴነታቸው ታጭደው ለገቢያ ይቀርባሉ ለምሳሌም
 - ሰናር መኖ በስላሌ አካባቢ
 - በቆሎና ማሽላ በአፋር
 - የሱዳን ሳር በጅግጅጋና በጎዴ
 - አሸት በቆሎ የተቆረጠለት አገዳ በአረንጓዴነቱ ለእነስሳት መኖ በሐዋሳ አካባቢ ይሸጣል



የመኖ ሰበሎች አመራረት ዘዴዎች

የተሻሻሉ የመኖ ሰበሎችን በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ማምረት ይቻላል

1. የመኖ ሰበሎችን ልክ እንደ ሌሎች የምግብ ሰበሎች በመደበኛ የአመራረት ዘዴ ማልማት
2. የመኖ ሰበሎችን ከሌሎች ሰበሎች ጋር በቅንጅት አንዲሁም ከሌሎች የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎችና ሌሎች የግብርና ዘዴዎች ጋር ማልማት ናቸው



የመኖ ልማት መሰረታዊ የሆኑ የመስክ ስራዎች

1. ተስማሚ አካባቢና ፣ ማሳ መረጣ
2. የማሳ ዝግጅት
3. የዘር ዝግጅት
4. ዘር መዝራት ፣ መትከል እና ማዳበሪያ መጨመር
5. አረም፣ በሽታና ተባይ ቁጥጥር
6. አጨዳ ወይም በእንስሳት ማስጋጥ
7. የግራም የመኖ ሰብሎች ቀጣይ አያያዝ



ሀ) የመኖ ዝርያ መረጣ

በአንድ በተወሰነ አካባቢ መኖ ለማልማት በሚፈለገበት ጊዜ ተስማሚ የሆነ የመኖ ዝርያ ለመምረጥ የአካባቢውን የአየር ሁኔታ፣ የአፈር ዓይነት አንዲሁም የግብርና ዘዴ በቂ መረጃ መኖር አለበት

- የሚመረተው መኖ ለምን ጥቅም እንደታቀደ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የወተት ላሞችን ከሆን የሚዘራው መኖ ለወተት ከብቶች ተስማሚ መሆን አለበት
- በአካባቢው ያለውን የመኖ ልማት ስራዎች ማወቅና ውጤታማ ልምዶችን መቅሰም ይመከራል
- ከላይ የተዘረዘሩት ሁኔታዎች መሰረት ተደርጎ የመኖ ዝርያዎችን መምረጥ ያስፈልጋል የመኖዎች ዝርያም
 - ዓመታዊና ሰንባች (ዘላቂ)
 - የሳር፣ ቅጠላቅጠል እና የቅንጠባ መኖ ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ

ለ) ማሳ ዝግጅት

- የመኖ ሰብሎችን ለመዝራት የሚደረግ የማሳ ዝግጅት እንደ ሰብሎች ዓይነት ይለያያል
- ደቃቅ ዘር ላላቸው የመኖ ሰብሎች የማሳ ዝግጅቱ በደመብ የለሰለሰ ፣ እንዲሁም ከአረም የነፃ መሆን አለበት
- አብዛኞቹ ዓመታዊ የመኖ ሰብሎች የማሳ ዝግጅታቸው ቀላል ነው
- ማሳን በጊዜ ማዘጋጀት አንዲሁም በማሳው ውስጥ አስፈላጊውን ተፋሰስ መስራት ቡቃያዎ በጥሩ ሁኔታ እንዲያድግ ይርዳል



ሐ) ዘር ዝግጅት

እንደ ዝርያው ዓይነት የሰብሉ የመባዣ መንገድ በዘር፣ በግንደ ቁረጥራጭ እንዲሁም ከስር ግንጣይ ሊሆን ይችላል

- ዘሩ ከመዘራቱ በፊት የጥራት ደረጃው መፈተሽ አለበት
 - ከተለያዩ ብአድ ነገሮች ነፃ መሆኑ መረጋገጥ አለበት
 - የብቅለት ደረጃው ምን ያህል እንደሆነ መታወቅ አለበት
- የሚያስፈለገው ዘር በብቅለት ደረጃው ተስተካክሎ መገመት
- ዘሩ ከመዘራቱ በፊት ሌሎች ቅድመ ዝግጅት ካሉ ማረጋገጥ
- ለምሳሌ ዘሩ ራይዘቢየም የሚባል የባክቴሪያ ሰትሬን ኢኖኩላንት የሚያስፈለገው መሆኑን ማረጋገጥ

መ) የዘር መጠን

- የመኖ ሰብሎች አንደ ዘር መጠናቸውና ያክስተዳደግ ባህሪያቸው የዘር መጠናቸው በሄክታር ይለያያል
- ደቃቅ ዘር ያለቸው ዝርያዎች በአብዛኛው ከ 2-10 ኪ.ግ. ዘር በሄክታር በቂ ነው
- ለመኖ ሰብሎች የዘር መጠኑን ክፍ አድረጎ መዝራት በዙ ጊዜ ምንም ጉዳት የለውም፤ ነገር ግን ዘሩን በኢኮኖሚ መጠቀም ይገባል
- በአጠቃላይ የአያአንዳንዱ የመኖ ዝርያ አንደየአካባቢው፣ የማሳ ሁኔታ የተሰጠውን ምክረ-ሀሳብ (recommendation) የዘር መጠን መዝራት ጥሩ ነው
- በመስመር በሚዘራበት ጊዜ በመሰመር እና በተክሎች መካከል የሚኖረውን ስፋት በሚሰጠው ምክረ-ሀሳብ (recommendation) መሰረት መጠቀም ውጤታማ ያደርጋል

ሰ) ማዳበሪያ

- ከተቻለ የማሳዎቹ የአፈር ለምነት ምርመራ ማድረግ የሚያስፈልገውን የማዳበሪያ ዓይነትና መጠን ለመወሰን ይጠቅማል
- መሬቱ ምን ተዘርቶበት እንደነበርና አጠቃላይ መረጃዎችን ማወቅም ይረዳል
- አፈሩ ምን ዓይነት ንጥረ ምግብ እጥረት እንዳለበት ማወቅ ለምሳሌ

(ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ፖታሲየም)

- ምን ዓይነት ማዳበሪያ እንደሚገኝና የትኛውን መጠቀም እንደሚሻል ማወቅ፡
 - ኮምፖስት ወይም ፍግ
 - ዩሪያ ፣ ዳፕ እና የመሳሰሉት
- ሰብሎ እንደ መሬቱ ሁኔታ ምን ያህል ማዳበሪያ እንደሚያስፈልገው ማወቅ
- በምከረ ሀሳብ የተሰጠውን የአጨማመር ዘዴ መጠቀም
ለምሳሌ ሁለት ጊዜ ከፍሎ መጨመር
- የተለያዩ የማዳበሪያ ዓይነቶች ሲጨመሩ መጠኑን በጥንቃቄ ማስላት ያስፈልጋል

ሰ) ማዳበሪያ

ገበሬው በብዛት የሚጠቀሙት የማዳበሪያ ዓይነቶች

- ዩሪያ – (ናይትሮጅን : ዩራኒየም : ፖታሲየም - **46:0:0**)
- ዳፕ (Dai-ammonium Phosphate) – $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$
(ናይትሮጅን : ዩራኒየም : ፖታሲየም - **18:46:0**)
- ቲኤስፒ – (Triple Super Phosphate) –
(ናይትሮጅን : ዩራኒየም : ፖታሲየም - **0:46:0**)
- ሌሎችም



ረ) መዝራት / መትከል

- የመኖ ሰብሎች በተለያዩ መንገዶች ሊዘሩ ይችላሉ
 - በማሸነፊያ የታገዘ አዘራር፣ በእንስሳት የታገዘ ወይም በሰው ጉለበት
 - በብተና መዝራት ወይም በመስመር መዝራት
- ትልልቅ የዘር ፈሬ ያላቸው ዝርያዎች አዘራራቸው እንደ ምግብ ሰብሎች ተማሳሳይ ነው
- ነገር ግን ብዛት ያላቸው የመኖ ዝርያዎች ዘራቸው ደቃቅና ቀላል በመሆናቸው ሲዘሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል
 - ይህም ዘሮቹ በጣም እንዳይቀበሩ ማድረግ
 - አዘራሩም እኩል እንዲዳረስ ተደረጎ መዘራት አለበት ምክንያቱም ቀላል ዘሮች በንፋስ ይወሰዳሉ
 - ዘሩን ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ቢዘሩት ይመረጣል



ሠ) ዘር የማልበስ ዘዴ

- ዘር ከተዘራ በግላ በትክክለኛ መጠን አፈር መልበስ አለበት
- በጣም ደቃቅ ዘሮች ከተዘሩ በግላ የዛፍ ቅርንጫፍ በመጎተት ማልበስ አንድ አማራጭ ሊሆን ይችላል
- በማሳው ላይ ከበት መንዳትና መዝራት (የበህላዊ የጤፍ አዘራር ዘዴ መጠቀም)
- ዘሩን ዘረቶ አፈር ሳያለብሱ እንዲሁ መተው
- ዘሩን በትክክል ለማዳረስ ዘሩ ላይ አፈር፣ አሸዋ ወይም ማዳበሪያ በመቀላቀል መዘራት

- በግንድ፣ አገዳ፣ ወይም በሰር ግንጣይ የሚተከሉ ዝርያዎች በቀላሉ ስለሚለመዱ የተሻለ መንገድ ነው
- ለምሳሌም እንደ ዝሆኔ ሳርና ደሾ ሳር



ሸ) አረምን መቆጣጠር


- ዘር ከተዘራ በግላ ማሳውንና ቡቃያውን መከታተል ያስፈልጋል ምክንያቱም
 - ዘሩ በወፍና፣ በተበይ ሊበላ ይችላል
 - ቡቃያው በተበይ፣ በሽታና ለጠቃና በጎርፍ ሊጠረግ ይችላል
 - ዘርና ቡቃያ በተባይ እንዳይጠቃ ዘሩን በኬሚካል ማሸት ወይም ቡቃያውን መርጨት ይቻላል
- የማሳ ዝግጅት በሚደረግበት ወቅትና የመዝሪያውን ቀን/ወቅት በማስተካከል የተባይ፣ በሽታና አረምን መቀነስና መከላከል ይቻላል
- አረም በተለይ በሰነባች የመኖ ሰብሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳሉ፡ ይህም የሚሆንበት ምክንያት ዘላቂ ወይም ሰንባች ዝርያ ቡቃያዎች እድገታቸው ዘገምተኛ በመሆኑ የአረሙን ፈጣን እድገት መግባቱም አይችሉም :: ስለዚህ
 - ተገቢው የማሳ ዝግጅት በወቅቱ ማድረግ
 - በሰው ጉለበት በእጅ ማረም
 - የተመረጡ የአረም ማጥፊያ መድሃኒቶችን መጠቀም
 - አረሙንና የመኖ ሰብሎን በሊጋነታቸው ማጨድ ወይም በከብት ማስጋጥ ዋና ዋና የአረም መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ናቸው

ቀ) አጨዳ ወይም ግጦሽ

የመኖ ሰብሎችን ለማጨድ በምንዘጋጅበት ጊዜ መታወቅ ያለባቸው ዋና ዋና ነገሮች

- የሰብሎ የማጨዳ ጊዜ መቸ እንደሆነና የሰብሎ የአደገት ደረጃ
- ሲታጨድ ሊሰጠው የሚችለው የመኖ ምርት
- ሲታጨድ የሚነረው የመኖ የንጥረ ምግብ ይዘት
- የማጨዳው መሳሪያ በአጭር ጊዜ አጭዶ መጨረስ የሚያስችል መሆኑን ማረጋገጥ
- ተከማቾቹ የሚቆይበትን መንገድ (ደረቆሽ / ገፈራ) መወሰን
- በእንስሳት የመበላት መጠኑና ሌሎችንም ማወቅ

የመኖ ሰብሎ ሲታጨድ እንደ መመሪያ መወሰድ ያለበት የመኖ ምርታማነትና ጥራት ከፈተኛ መሆኑን ማረጋገጥ ነው



ቀ) አጨዳ ወይም ግጦሽ

- የመኖ ሰብሎች በአብዛኛው ጥራቱና ምርታማነቱ የተመጣጠነ የሚሆኑበት የእድገት ደረጃ ሰብሎ ማብብ ከጀመረበት እስከ 50% አበባ እስከሚያወጣበት ጊዜ ነው።



- የመኖ ሰብሎች አጨዳ በአጭር ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ አለበት ምክንያቱም የአጨዳ ጊዜ በተራዘመ ቁጥር የጥራት ደረጃው እየቀነሰ ስለሚሄድ ነው።

በ) የመኖ ሰብሎች ቀጣይ አያያዝ

- የመኖ ሰብል የሚታጨድበት ወቅት ከፈተኛ ምርት በሚሰጠበት ጊዜ መሆን አለበት፤ ለምሳሌ የዝናብ መጨረሻ ወቅት
- ለዘላቂ የመኖ ሰብሎች የማጨጃ ወቅት ቀጣዩን የእድገት ወቅት ያገናዘበ መሆን አለበት ለምሳሌ የዝናብ መጀመሪያ ወቅት ማጨድ በቀጣይ ጥሩ ምርት ለማግኘት ያስችላል
- ውርጭ ባለበት አካባቢ ወርጭ የሚያጠቃቸውን የመኖ ሰብሎች ውርጭ ከመድረሱ በፊት መታጭደ አለበት
- በዘላቂ መኖ ሰብሎች ላይ በዓመት አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ አረም ማረም፣ ወይም የአረም መድሃኒት መርጨት እንዲሁም ፍግ ወይም ማዳበሪያ መጨመር ያስፈልጋል.
- ማዳበሪያና ፍግ የሚጨመረው አንደመሬቱ ለምነት ሁኔታ እየታየ መሆን አለበት
- በበጋ ወራት መስኖ መጠቀም ከተቻለ ከፈተኛ ምርት ሊያስገኝ ይችላል



በደጋና በወይና ደጋው አካባቢ የተላመዱና
በምርታማነታቸውና በጥራታቸው ውጤታማ
የሆኑ የተመረጡ የመኖ ሰብል ዝርያዎች

1. ስናር / ሸማማ / ሻሎ (Oats)

- ስናር ዓመታዊ ቁመቱ እስከ 2 ሜትር የሚደረስ የሳር ዝርያ ነው
- ተስማሚ የአየር ሁኔታ - ቀዝቃዛና ደጋማ የአየር ሁኔታና የአፈር ለምነቱ ደካማ የሆኑ መሬቶች ላይ በብዛት ይመረታል
- ስናር የተለያዩ ዝርያዎች አሉት - እነዚህም በቁመት ለአጨዳ በመደረሱበት የጊዜ ርዝመት በዘር ፍሬቸው መጠን እና በመሳሰሉት ይለያያሉ
- ስናር የሚባዛው በዘር ሲሆን 100 ኪ.ግ. ዘር በሄክታር ይበቃል ፣ በመስመር ሲዘር መስመሮቹ 15-20 ሳ.ሜ. መራራቅ አለባቸው
- ስናር ከመኖ ፻፶ ጋር ተደባለቆ (25/75 ፻፶/ ስናር ኪ.ግ. በሄክታር) ሲዘራ ጥራት ያለው ብዙ ምረት ይስጣሉ
- ማዳበሪያ - ሰብሉ ሲዘራ 100 ኪ.ግ ዳፕ በሄክታር ወይም ፍግ በበቂ መጨመር፤ አንድ ዝናቡ ሁኔታ ማደባሪያውን ከሁለት ከፍሎ መጠቀም ምርታማነቱን ይጨምራል



1. ስናር / ሸማማ / ሻሎ (Oats)

- አረም ቁጥጥር – በሰው ጉልበት በእጅ ማረም ወይም ፀረ አረም መድሃኒት መርጨት
- አጨዳ – በማጭድ፣ በፋልቸ (scythe) ወይም በማሸን ስናሩ 50% ሲያዘረዘር መታጨድ አለበት
- የስናር መኖን በድረቆሽ ወይም በገፈራ መልክ ተዘጋጅቶ አከማቸቶ ማቆየት ይቻላል
- አጠቃቀም – የስናር ደረቆሽ ጥሩ የመኖ ምንጭ ነው። በተለይ በአረንጓዴነቱ መጠቀም ውጤታማ ነው። ነገር ግን ተጨማሪ የድጎማ መኖ ያስፈልገዋል



- ምርታማነት – ከ 8 - 15 ቶን ድርቆሽ በሄክታር ማግኘት ይቻላል። ዝናብ ባለበት አካባቢ ስናር ከታጨደ በግላ አንደገና ያድጋል መኖም ሊሰጥ ይችላል
- ዘር – ስናር ጥሩ ዘር የሚሰጥ ሲሆን እንደዘርያው ዓይነት ከ5 እስከ 35 ኩንታል ዘር በሄክታር ይሰጣል
- የስናር ዘር - ለሰው ምግብነት እንዲሁም ለእንስሳት መኖነት ሊውል ይችላል
- ዘር በሚመረቱበት ወቅት ገለባው ለእንስሳት መኖነት ይውላል

ስናር / ሸማማ / ሻሎ (Oats) – የተለያዩ ዝርያዎች



2. የመኖ ዳያ (Vetches)

- የመኖ ዳያ ዓመታዊ ቅጠላቅጠል መኖ ሲሆን አስተዳደጉም የሀረግነት ባህሪ ያለው ነው
- የመኖ ዳያ ቀዝቃዛ በሆኑ ደጋና ወይና ደጋ አካባቢዎች የተንጣፈፈ መሬት ይስማማዋል
- የተለያዩ ዝርያዎች ፤ ፈጥነውና ዘግይተው የሚደረሱ እና ሌሎችም ባህሪዎች አላቸው
- የመኖ ዳያ የሚባዛው በዘር ሲሆን 25 ኪ.ግ ዘር በሄክታር ይዘራል። በመስመር ሲዘራ ከ20-30 ሴ.ሜ. ተራርቀው መዘራት አለባቸው
- የመኖ ዳያ ከስናር ጋር ተደባለቆ (25/75 ዳያ/ ስናር ኪ.ግ. በሄክታር) ሲዘራ ጥራት ያለው ብዙ ምረት ይስጣሉ
- የመኖ ዳያ ዝርያዎች በደጋ በቆሎ ውስጥ በቅንጅት በመዝራት ተጨማሪ መኖ ማግኘት ያስችላል
- ማዳበሪያ የሚጨመረው የማሳው አፈር ከተመረመረ በኋላ ሲሆን ይመከራል ፤ በአጠቃላይ 100 ኪ.ግ. ዳፕ በሄክታር በዘር ወቅት መጨመር ይመከራል



2. የመኖ ዳያ (Vetches)



- የአረም ቁጥጥር – በሰው ጉልበት በእጅ ማረም
- አጨዳ – በማጭድ በፋልች (scythe) የመኖ ዳያው 50% ሲያብብ መታጨድ አለበት
- የመኖ ዳያ በድርቆሽ ወይም ከሌሎች መኖዎች ጋር በገፈራ መልክ ተዘጋጅቶ ማከማቸት ይቻላል
- አጠቃቀም – የመኖ ዳያ ከፍተኛ ፕሮቲን ስላለው ጥሩ የድጎማ መኖ መሆን ይቻላል ፣ ስለዚህ ከሳር ድረቆሽ ወይም ከገለባ ጋር ተቀላቅሎ ቢሰጥ መልካም ነው
- ምርታማነት – ከ 6 -13 ቶን ድርቆሽ በሄክታር ይሰጣል
- ዘር – የመኖ ዳያ ጥሩ ዘር ይሰጣል ምርታማነቱም ከ2 እስከ 6 ኩንታል በሄክታር ይሰጣል ነገር ግን ውርጭ ባለበት አካባቢ የመኖ ዳያ በውርጭ ይጠቃል ለዚህም የዘር ምርት ለማግኘት ያስቸግራል

3. ላብላብ (*Dolichos lablab*)

- ዓመታዊ / የአጭር ጊዜ ሰንባች ቅጠላቅጠል ዝርያ – እንደ ሐረግ በፍጥናትና በግዝፈት የሚያድግ
- በወይና ደጋና በቆላማ አካባቢ የተላመደና በዝናብና በመስኖ የሚለማ
- ለተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎች አሉት
- ላብላብ የሚባዛው በዘር ሲሆን የዘር መጠኑም ከ 15 - 25 ኪ.ግ በሄክታር ሲሆን በመስመር ሲዘራ ከ80 -100 ሴ.ሜ በመስመር መካከል እንዲሁም 30-50 ሴሜ በተከል መካከል መራራቅ አለባቸው
- እንድ ፓኒክም ካሉ የሳር ዝርያዎች ጋር በድብለቅ በመዝራት ጥራት ያለው መኖ ማምረት ይቻላል
- በበቆሎና ማሽላ ስር በመዝራት ከእህል ምርት በተጨማሪ ጥራት ያለው መኖ ማምረት ይቻላል
- እንደ መሬቱ ለምነት ዳፕ ማዳበሪያ 100 ኪ.ግ. ዳፕ በሄክታር ሲዘራ ቢጨመር ጥሩ ነው (100 kg DAP (18 kg N + 46 kg P2O5 / ha))



3. Lablab (*Dolichos lablab*)

- አረም – በሰው ጉለበት በእጅ ማረም
- አጨዳ – ሰብሉ 50% ሲያብብ በማጭድ ወይም በፋልች (scythe) ማጨድ
- የታጭደው መኖ በድረቆሽ ወይም ከሌላ መኖ ጋር ተቀላቅሎ በገፈራ (silage) መልክ ተዘጋጅቶ ሊቀመጥ ይችላል
- አጠቃቀም - ጥራት ያለው መኖ ስለሆነ ከገለባ ወይም ከሳር ድረቆሽ ጋር ቀላቅሎ መመገብ ጥሩ ነው
- ምርታማነት – ከ 6 - 9 ቶን በሄክታር ድርቆሽ ይሰጣል፤ በመስኖ በሚዘራበት ወቅት ምርታማነቱ ከዚህ እጅግ የላቀ ነው
- ዘር – ላብላብ ብዙና ጥራት ያለው ዘር ይሰጣል፤ ከ 9 - 25 ኩንታል በሄክታር



4. የላም አተር (Cowpea)

- ዓመታዊ የመኖ ቅጠላቅጠል (legume) – የሐረግነት ፀባይ ያለው ዝርያ ነው
- ተስማሚ የአየር ሁኔታ - በወይናደጋና ቆላማ አካባቢዎች በዝናብና በመስኖ በጥሩ ሁኔታ ያድጋል
- የላም አተር የተለያዩ ዝርያዎች አሉት
- የሚባዛው በዘር ሲሆን የዘር መጠኑም ከ 15 - 25 ኪ.ግ. በሄክታር ሲሆን በመስመር ሲዘራ 80-120 ሴ.ሜ በመስመር መካከል እንዲሁም 30-50 ሴ.ሜ በተክል መካከል ማራራቅ ያስፈልጋል
- እንደ ፓኒክም ካሉ የሳር ዝርያዎች ጋር በስብጥር ሲዘራ ውጤታማ ነው
- የላም አተር እንደ በቆሎና ማሽላ ካሉ ሰበሎች ጋር በስረቸው ቢዘሩ (undersown) ጥራት ያለው መኖ ይስጣሉ
- እንደ ማሳወ ዓይነትና ሁኔታ ሲዘራ ማዳበሪያ መጨመር ጥሩ ነው 100 ኪ.ግ. ዳፕ በሄክታር (100 kg DAP/ha (18 kg N + 46 kg P2O5 / ha)



4. የላም አተር (Cowpea)

- አረም – በሰው ጉለበት በእጅ ማረም
- አጨዳ – ሰብሉ 50% ሲያብብ በማጭድ ወይም በፋልች (scythe) ማጨድ
- የታጭደው መኖ በድርቆሽ ወይም ከሌላ መኖ ጋር ተቀላቅሎ በገፈራ (silage) መልክ ተዘጋጅቶ ሊቀመጥ ይችላል
- አጠቃቀም - ጥራት ያለው መኖ ስለሆን ከገለባ ወይም ከሳር ድርቆሽ ጋር ቀላቅሎ መመገብ ጥሩ ነው
- ምርታማነት – ከ 6 - 9 ቶን በሄክታር ድርቆሽ ይሰጣል፤ በመስኖ በሚዘራበት ወቅት ምርታማነቱ ከዚህ እጅግ የላቀ ነው
- ዘር – የላም አተር ብዙና ጥራት ያለው ዘር ይሰጣል፤ ከ 9 - 25 ኩንታል በሄክታር

5. የከበት ድንች (Fodder beet)

- ዓመታዊ የመኖ ስራ-ስር ተክል
- ተስማሚ የአየር ሁኔታ - የከበት ድንች ቀዝቃዛ በሆኑ ደጋማ አካባቢዎች ለምና ውሃ የማይጠጥርና አሸዋማ አፈር ይስማማዋል
- የሚባዛው በችግኝ ሲሆን አልፎ አልፎ በቀጥታ ዘሩንም መዘራት ይቻላል
- በማሰመር ሲዘራ 50 ሴሜ በመስመር መካከል እንዲሁም 30-60 ሴሜ በተክል መካከል አራርቆ መትከል ያስፈልጋል
- ማዳበሪያ - ለም በሆነ መሬት ወይም በግር አካባቢ መትከል አንዲሁም በሌሎች ቦታዎች ላይ 100 ኪግ. ዳፕ በሄክታር መጨመር



5. የከብት ድንች (Fodder beet)

- አረም – በሰው ጉለበት በእጅ ማረም አና በተደጋጋሚ መኮትኮት አና አፈር ማስታቀፍ
- የከብት ድንች ለመኖነት ከደረሰ በ፱ላ መሬት ውስጥ እንዳል ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል
- አጠቃቀም – ቀረጣጥፎ ከሌሎች መኖዎች ጋር ቀላቅሎ ለእንስሳት መመገብ
- ምርታማነት – ከ 5 – 10 ቶን ደረቅ መኖ በሄክታር ይሰጣል፤
- ዘር – የከብት ድንች የሚያብበውና ዘር የሚሰጠው በጣም ቀዝቃዛ በሆኑ ቦታዎች ነው ለምሳሌ መራሮ (አርሲ)



6. ዝሆኔ ሳር (Elephant grass)

- ለዓመታት የሚቆይ ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ የሳር ዝርያ ነው
- ተስማሚ የአየር ሁኔታ - በቆላማ አካባቢዎች በዝናብና በመስኖ በጥሩ ሁኔታ ያድጋል ከዚህም በተጨማሪ በደጋ አካባቢ ተስማሚ ዝርያዎች አሉ ነገር ግን ውርጭ ያጠቃዋል
- ዝሆኔ ሳርን ከአገዳው ወይም ከሰር ግንጣይ በመትከል በቀላሉ ማልማት ይቻላል
- በመስመር ሲዘራ 1 ሜ በመስመር መካከል እንዲሁም 30-50 ሴሜ በተክል መካከል አራርቆ መትከል ያስፈልጋል
- ማዳበሪያ - ሲተክል 100 ኪ.ግ ዳፕ በሄክተር ወይም ፍግ በበቂ መጠን፤ ሁለተኛው ዓመት በጧላም በየዓመቱ ፍግና ማዳበሪያ እንደየሁኔታው መጠን መጠንቀቅ
- የመኖ ጧያና ዲስፎስፎስም ከ ዝሆኔ ሳር ጋር በስብጥር ቀላቅሎ መዝራት ምርታማነቱንና የመኖ ጥራቱን ይጨምራል



6. ዝሆኔ ሳር (Elephant grass)

- አረም – በየተወሰነ ጊዜ በተለይ ከአጨዳ በግላ ቢታረምና ቢኮተኮት በጣም ጥሩ ነው
- ቁመቱ ከ 1 -1.5 ሜ ሲሆን ማጨድ ምርቱንም የመኖ ጥራቱንም ከፍተኛ ያደረገዋል
- አጠቃቀም – አረንጓዴውን አጭዶ ለእንስሳት መመገብ ተመራጭ ነው፤ ገፈራ (silage) ሰረቶ ማቆየትም ሌላ አማራጭ ነው
- በእንስሳቶች ተወዳጅና የፕሮቲን መጠኑም 9% በላይ ነው
- ምርታማነት – 10 - 30 ቶን በሄክታር ድርቆሽ በዝናብ ይሰጣል በመሰኛ ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ምርት ይሰጣል
- ዘር – ዝሆኔ ሳር በአብዛኛው ዘር አይሰጥም ነግር ግን በቀላሉ ከአገዳው ወይም ከስር ግንጣይ በቀላሉ ይባዛል፤



7. ብራካሪያ ሳር (Brachiaria grass)

- የብራካሪያ ሳር በዝናባማና ቆላማ በሆኑ አካባቢዎች የተላመደ ሰንባች (ዘላቂ) የሳር ዝርያ ሲሆን በኢትዮጵያ ሙላቶ 2 (Mullato II) የሚባለው ዝርያ በብዙ ቦታዎች የተላመደ ነው
- የሚባዛው በዘር ሲሆን ከ 5 – 10 ኪ.ግ. ዘር በሄክታር ይበቃል፤
- ከዚህ በተጨማሪ የሰር ግንጣይ በመጠቀም ማልማት ይቻላል።
- በመስመር በሚዘራበት ጊዜ በመስመሮች መካከል 50 ሴ.ሜ. እንዲሁም በተክሎች መካከል 50 ሴ.ሜ መራራቅ አለባቸው
- ማዳበሪያ ወይም ፍግ እንደ አፈሩ ሁኔታ መጨመር ውጤታማ ያደርጋል። በአጠቃላይ ግን ሲዘራ ወይም ሲተከል 100 ኪ.ግ. ዳፕ በሄክታር እንዲሁም በቀጣዮቹ ዓመታት 50 - 75 ኪ.ግ ዩሪያ በሄክታር በየዓመቱ መጨመር ይጠቅማል



7. ብራኬሪያ ሳር (Brachiaria grass)

- የብራኬሪያ ሳርን ድርቆሽ ወይም ገፈራ በመሰራት መቆየት ይቻላል
- በብዙ አገሮች ብራኬሪያ ሳር የሚጠቀሙት ለግጦሽ ነው እንዲሁም በአረንጓዴነቱ እያጨዱ ለእንሰሳት መመገብ ይቻላል



- ምርታማነቱም እስከ 13 ቶን ድረቆሽ በሄክታር ሲሆን በመስኖ ሲዘራ ግን በጣም ከፍተኛ ምርት ይሰጣል
- ዘር – ብራኬሪያ ሳር ጥሩ ዘር ይሰጣል ነገር ግን በሀገራችን በአብዛኛው የሚባዛው በስር ግንጣይ ነው

8. ደሾ ሳር (Desho grass)

- ደሾ ሳር ሀገር በቀል የሆን ሰንባች የመኖ ሳር ነው
- ሰፋ ባል ስነምህዳር በተለይም ዝናባማ በሆኑ ወይና ደጋ እስከ ቆላማ ቦታዎች የተላመደ ነው
- የሚባዛው በስር ግንጣይ ሲሆን በማስመር በሚዘራበት ጊዜ በመስመሮች መካከል 10 ሴ.ሜ. እንዲሁም በተክሎች መካከል 10 ሴ.ሜ መራራቅ አለባቸው
- ፍግና ማዳበሪያ መጨመር ምርታማነቱን ይጨምራል .
- ምርታማነቱ ከ 10 እስከ 20 ቶን ድርቆሽ በሄክታር ይሠጣል፤ በዓመትም በዝናብ ከ 2 – 4 ጊዜ ማጨድ ይቻላል
- ቁመቱ 80 ሴ.ሜ ሲሆን እያጨዱ ለእንስሳት መመገብ የተሻለ የአጠቃቀም ዘዴ ነው።
- ዘር ብዙ ጊዜ አይሰጥም



9. ሮደስ ሳር (Rhodes grass)

- ከ 1 – 2 ሜትር ቁመት የሚያድግ ሰንባች (ዘላቂ) የመኖ የሳር ዝርያ ነው
- ሮደስ ሳር ከደጋ አስከ በርሃ የአየር ሁኔታ ባለቸው አካባቢዎች መብቀል ይችላል
- የሚባዛው በዘር ሲሆን እንደየ ሁኔታው ከ 2-10 ኪ.ግ. ዘር በሄክታር ይዘራል :: ሲዘራም በብተና ወይም በመሰመር 20 ሴሜ አራርቆ መዘራት ይቻላል
- ከአልፋ-አለፋ አና ከእስታይሎ ከሚባሉ የቅጠላቅጠል ዝርያዎችና እንዲሁም ከሌሎችም ጋር በድበልቅ መዘራት ጥራት ያለው መኖ ይሰጣል
- ማዳበሪያ - አንደ መሬቱ ለምነት ይወሰናል በጥቅሉ ግን ሲዘራ 100 ኪ.ግ ዳፕ ማዳበሪያ በሄክታር እንዲሁም ከሁለተኛው ዓመት ጀምሮ አንደየሁኔታው ፍጣ ወይም ዩሪያ ማዳበሪያ መጨመር ያስፈልጋል



9. ሮደስ ሳር (Rhodes grass)

- አረም ቁጥጥር – በሰው ጉልበት በእጅ ማረም ወይም ፀረ አረም መድሃኒት መርጨት
- አጨዳ – በማጭድ፣ በፋልች (scythe) ወይም በማሽን 50% ሲያዘረዝር መታጨድ አለበት
- ምርታማነት – ከ 8 - 25 ቶን ድርቆሽ በሄክታር ይሰጣል፣ በደጋ አካባቢ ዝቅተኛ ሲሆን ሞቃታማ አካባቢ ከፍተኛ ነው፣ በመስኖ ሲሆን በጣም ከፍተኛ ምርት ይሰጣል
- ደርቆሽ ቀላሉ አከማችቶ የማቆያ ዘዴ ሲሆን በአረንጓዴነቱ እንስሳትን መመገብ ጠቃሚ ነው
- አጠቃቀም – የሮደስ ሳር እንደመሰረታዊ መኖ (basal diet) ይጠቅማል ስለዚህ ለምረታማ እንስሳት የድጎማ መኖ ያስፈልጋቸዋል፣ የሮደስ ሳር ማሳ በቀላል ግጦሽ ማስጋጥ ይቻላል
- ዘር – ከ 200 - 500 ኪ. ግ. ዘር በሄክታር ይሠጣል



10. ትሪሎሰርን የቅንጠባ መኖ ዛፍ ነው

- ትሪሎሰርን ቀሚ የሆን የቅንጠባ መኖ ዛፍ ነው
- ደጋና ቀዝቃዛ አካባቢ የተንጣፈፈ አፈር ይስማማዋል
- የሚባዛው በችግኝ ሲሆን በተወሰኑ አካባቢዎች በቀጥታ ዘሩን መዘራት ይቻላል። በማሰመር ሲተከል 1 ሜ በመሰምረ መካከል እንዲሁም 50 ሴ.ሜ. በተከል መካከል ማራራቅ ያስፈልጋል፤ ዘሩ በደምብ እንዲበቀል በፈላ ውሃ ከ7 እስከ 9 ደቂቃ መቀቀል አለበት
- ማዳበሪያ - ሲተከል ዳፕ በመጠኑ ቢጨመር ለእድገት ይረዳዋል
- ምርታማነት - ከ 4 -10 ቶን በሄክታር የሚበላ ድረቀሽ ይሰጣል
- የትሪሎሰርን አበባ ለንቦች ጥሩ መኖ ነው
- አጠቃቀም - በአረንጓዴነቱ እየቆረጡ አጠውልጎ ለእንስሳት መመገብ ጥሩ ዘዴ ነው
- ዘር - ጥራትና ብዛት ያለው ዘር ይሰጣል



አልፋ-አልፋ (Alfalfa)

- አልፋ-አልፋ ከፈተኛ የነጥረ ምግብ ይዘት ያለው ሰንባች (ዘላቂ) የቅጠላቅጠል መኖ ዝርያ ነው
- በተለያዩ የአየርና አፈር ሁኔታዎችና አከባቢዎች የተለመደ ሲሆን ከደጋ እስከ በርሃ ደረስ መብቀል ይችላል- አሲዳማ አፈር አይስማማውም
- አልፋ-አልፋ በቀላሉ ከዘር መባዛት ይቻላል፣ ሲዘራም በብተና ወይም በመስመር (20 ሴ.ሜ አራረቆ) እንደየሁኔታው ከ 2-10 ኪ.ግ. ዘር መጠን በሄክታር በመጠቀም መዝራት ይቻላል
- ከፓኒክም፣ ከሮደስ አንዲሁም ከሌሎች ሳሮች ጋር በድብልቅ መዝራት ብዛት ያለው መኖ ይሰጣል
- ማዳበሪያ ወይም ፍግ እንደ መሬቱ ለምነት መጨመር ይቻላል። ሲዘራ 100 ኪ.ግ. ዳፕ በሄክታር መጨመር ለእድገት ይርዳዋል



መልመጃ

- የመጣችሁበትን አካባቢ (ወረዳ/ቀበሌ) ውስጥና ዋና ዋና መረጃዎችን አጠናቅቅ፤ መረጃዎቹም የአካባቢውን አማካኝ ያአየር ሁኔታ (የዝናብ መጠን፣ የአየር ሙቀት፣ ወዘተ)፣ የእንስሳት ዓይነትና ብዛት፣ የአርባት ዘዴ በመዘርዘር ተወያዩበት
- ከላይ ያለውን መረጃ መሰረት በማድረግ የትኞቹ የመኖሪያ ሰብሎች ባአካባቢው ሊለሙ ይችላሉ፣ የእንስሳት አረቢዎችን የተኞቹን ይመርጣሉ ብላችሁ ታስባለችሁ? ለምን?
- የተመረጡ የመኖሪያ ሰብሎችን ዘርዘሩና በምን ዓይነት መልኩ መልማት አንደሚቻልና በአጭሩ መሰረታዊ ለማልማት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ግለፁ

